

Penicilline und Cephalosporine

		Medikamenten- konzentration		Sofortypreaktion		Spättypreaktion		
		[mg/mL]	Vaseline	Scratch	i.d.	i.d. nach 24 Stunden	epikutan nach 48 Stunden	epikutan nach 72 Stunden
	Prick:Histamin 2 mg/mlNaCl 0,9%Codein 9%	i.d. (.....Histamin 1:10000)NaCl 0,9%						
1.	Vaseline							
2.	Lösungsmittel (PBS) 0,1 M pH 8							
3.	Natriumlaurylsulfat 0.25%							
4.	PPL-Pen-Kit (Benzylpenicilloyl PPL 0.004mg)	in 1 mL						
5.	MDM-Pen-Kit	in 1 mL						
6.	Amoxicillin (Clamoxyl i.v. Lösung 250mg/5mL; 1:10) / Vaseline	5mg/mL	5%					
7.	Clavulansäure (125mg/mL) / Vaseline	125mg/mL	5%					
8.	Ampicillin Trihydrat (125mg/mL) / Vaseline	125mg/mL	5%					
9.	Cefadroxil (125mg/mL) / Vaseline	125mg/mL	5%					
10.	Penicillin-G (Pen-G Grünenthal 1Mega/5mL; 1:20) / Vaseline	10'000E/mL	5%					
11.	Cefuroxim (Zinacef i.v. Lösung 750mg/10mL; 1:10)	7.5mg/mL						
12.								
13.	Ceftazidim (Fortam i.v. Lösung 500mg/5mL; 1:10)	10mg/mL						
14.	Cefazolin (Kefzol i.v. Lösung 1000mg/2.5mL; 1:10)	40mg/mL						
15.	Ceftriaxon (Rocephin i.v. Lösung 500mg/5mL; 1:10)	10mg/mL						
16.	Cefepime (Cepimexi.v. Lösung 1000mg/3mL; 1:10)	33mg/mL						
17.								

i.d.-Teste: cave bei Anaphylaxie !