

Sulfonamide

Kontrollen:		Medikamenten- konzentration in %		Soforttyp- reaktion	nach 48 Stunden	nach 72 Stunden
		Sofort	Epikutan	Scratch		
Histamin 2mg/mlPhysiologische KochsalzlösungCodein 9%					
1.	Lösungsmittel (PBS) 0,1 M pH 8					
2.	Vaseline					
3.	Natriumlaurylsulfat 0.25%					

Benzene mit N4 Aminogruppe; Kreuzreaktionen möglich					
4.	Sulfanilamid	-	Hermal AZM I		
5.	Sulfadiazin Ph. Eur.	12.5	Flammazine®Crème1%		
6.	Sulfadoxin (Fansidar® 1 Tbl. à 500mg+2mL) ¹	25			
7.	Sulfamethoxazol (4°C, Reinsubstanz, J. Tilch)	12.5	5 (Insel Apo)		
8.	Sulfapyridin (4°C, Reinsubstanz, J. Tilch) ^{1,2}	25	-		
9.	Sulfasalazin (Salazopyrin® 1 Drg à 500mg+2mL) ^{1,2}	25	-		

Andere Sulfonamide					
10.	Celecoxib (Celebrex® 1 Kps à 200mg +1.6mL) ¹	12.5	5 (eigene)		
11.	Furosemid (4°C, Reinsubstanz, J. Tilch). ¹	12.5	-		
12.	Glibenclamid (Daonil® 1 Tbl à 5mg + 1 Trpf.) ¹	12.5	-		

Andere Wirkstoffe					
13.	Trimethoprim (4°C, Reinsubstanz, J. Tilch)	12.5	5 (Insel Apo)		
14.	5 ASA (Salofalk® 1 Tbl à 250mg + 1mL) ^{1,2}	25	-		

¹ nur auf spezielle ärztliche Verordnung

² Sulfasalazin wird im Kolon durch bakterielle Azoreduktase in 5-ASA und das kreuzreaktive Sulfapyridin gespalten.